Anthicides et Hylophilides des chasses de E. Gallois au Japon,

par M. Maurice Pic,
Correspondant du Muséum.

Les Anthicides et Hylophilides faisant l'objet du présent article ont été envoyés au Muséum de Paris par M. Edme Gallois. J'ai eu déjà l'occasion d'étudier précédemment quelques espèces récoltées par cet habile chasseur entres autres le Hylophilus Galloisi (*Bull. Mus. Hist. Nat.*, XVI, 1910, p. 20).

Notoxus Haagi Mars. Yose, ligne de Kofu, en juin et juillet.

Notoxus Haagi v. nov. **Galloisi.** Yose, 11 juillet 1909.

Elytris testaceis, ad basin et post medium nigro notatis. Long. 6 mill.

Cette variété se distingue facilement de la forme type par le dessin élytral foncé composé, sur chaque élytre, de macules isolées, au lieu de former une bande discale continue.

Mecynotarsus minimus Mars. Riv. Nagara à Gifu, 18 avril 1910.

Formicomus braminus Laf. et var. Mont Ibuki près Gifu, 2 juin 1910; Tokyo, 7 juillet 1907; Nakano, 26 mai 1907; Shinjiku, 31 juillet 1907; Shibuya, 2 juin 1907.

Pseudoleptaleus trigibber Mars. et var. Tokyo, en juin, juillet et septembre; Yose, ligne de Kofu, juillet 1909.

Anthicomorphus niponicus Lewis. Chuzenji, 28 juillet 1910; Alpes de Sasago, près de Kofu, 27 juillet 1908; Kumanotaïra, près Karuïzawa, 12 juillet 1908.

Anthicus valgipes Mars. Environs de Gifu, 19 avril 1910.

Anthicus floralis L. Shinjiku, près de Tokyo, 23 juin 1907; Tokyo, 12 juillet 1910.

Anthicus Confucii Mars. Nakano, près de Tokyo, 19 avril 1908.

Anthicus Marseuli Pic (scoticus Mars). Mont Takao, près Hochioji, 31 mai 1908; Mont Ibuki, près Gifu, 2 juin 1910; de Yose au col Tobotoke, 13 juin 1909; Kumanotaïra, près Karuizawa, 26 juin 1911.

Anthicus Marseuli var. cohoeres Lewis. Chuzenji, 26 août 1910; Tokyo, 15 juillet 1907; Kumanotaïra, près Karuizawa, 1er octobre 1907.

Anthicus lævipennis Mars. Chuzenji, 11 août 1910.

Anthicus fugiens Mars. Mont Kinkazan à Gifu, avril et juin 1910; Mont Takao, près Hachioji, en mai et juin; Mont Ibuki près Gifu, 6 juin 1910; Nakano, 19 mai 1907, etc.; Environs de Gifu, 19 avril 1910.

Anthicus baicalicus Muls. Rey et var. niponicus Lewis. Rivière Nagara à Gifu, 18 avril 1910.

Hylophilus (Olotelus) diversithorax n. sp. Mont Takao, 19 juin 1910.

Oblongus, nitidus, griseo pubescens, testaceus, capite nigropiceo, antennis pedibusque pro parte, thoraceque in disco brunnescentibus.

Oblong, brillant, revêtu d'une pubescence grise peu serrée, un peu soulevée sur les élytres, testacé avec le milieu du prothorax un peu rembruni, pattes et antennes testacées, ces organes étant en partie rembrunis. Tête subtronquée postérieurement, un peu rétrécie derrière les yeux, ceux-ci assez gros, éloignés entre eux ainsi que du bord postérieur de la tête dont la ponctuation n'est pas très forte et peu écartée; antennes longues et grêles, un peu épaissies à l'extrémité, à 2e article plus court que 3e, dernier court, subtronqué au sommet; prothorax ponctué comme la tête, assez court, rétréci en avant, tuberculé de chaque côté près et en avant du milieu, inégal et impressionné en dessus; élytres bien plus larges que le prothorax, subparallèles, un peu rétrécis à l'extrémité, nettement impressionnés antérieurement, à ponctuation assez forte et peu écartée; pattes assez grêles, tibias antérieurs un peu arqués, les médians et postérieurs subsinués. Longueur : près de 3 millimètres.

Voisin de H. flaveolus Muls., mais tête obscurcie, prothorax plus large et subanguleux sur les côtés vers le milieu.

Hylophilus (Olotelus) Harmandi Pic. Tokyo, 12 juin 1910.

J'attribue à cette espèce, comme ♀, un exemplaire, de Yose, de coloration analogue, mais de forme plus trapue, avec les antennes plus courtes, épaissies à l'extrémité, et les cuisses postérieures munies d'un appendice lamelliforme noir.

Hylophilus japonicus Champ. Mont Takao, près Hachioji, 15 mai 1908; Yose, 11 juillet 1909.

Hylophilus distortus Champ. Mont Takao, 19 juin 1910.

Hylophilus 4-maculatus Mars. var. Mont Takao, 23 mai 1908.

Hylophilus Grouvellei Pic. Environs de Gifu, 19 avril 1910; Tokyo, juillet 1909 et 1910.